

一、一般检查

- 1、探诊及检查顺序：应选择 5# 镰形探针，探针顺序为右上、左上、左下、右上，行全口牙的检查；
- 2、脓肿扪诊手法：用两指轻轻交替压迫脓肿部位组织；

二、社区牙周指数（CPI）检查

- 1、确定指数牙：①指数牙：17、16、11、26、27、31、37、36、46、47；②每个区段至少有两颗功能牙且无拔牙指征时，才可对该区段进行检查；③后牙若缺失一颗指数牙或有拔牙指征，不要只检查另一颗牙；④如一个区段内的指数牙全部缺失或有拔牙指征时，则只检查此区段内的所有其余牙，以最重情况计分；⑤如一个区段内的所有牙齿缺失，则该区段不做检查，按“除外区段”处理。
- 2、指数牙计分标准：每区段一个计分，后牙区段中两个指数牙以较重情况的牙计分，共六个计分，如一处计分错误扣 0.2 分；计分标准如下：0=牙龈健康；1=龈炎，探诊后出血；2=牙石，探诊可发现牙石，但探诊黑色部分全部露在龈袋外；3=早期牙周病，龈缘覆盖部分探诊黑色部分，龈袋深度在 4~5mm；4=晚期牙周病，探针黑色部分被龈缘完全覆盖，牙周袋深度在 6mm 以上；X=除区段外（少于两颗功能牙存在）9=无法检查。

三、牙髓温度测试

- 1、对照牙选择及测试位置：选择对侧同名正常牙作为对照牙，先测对照牙，再测测试牙
- 2、测试反应描述：正常、敏感、迟缓、无反应；冷热无反应说明牙髓坏死，冷热立即出现疼痛说明有炎症，刺激去除后疼痛立即消失说明牙髓充血，冷测缓解说明为慢性牙髓炎或部分牙髓坏死；

四、窝沟封闭术

- 1、酸蚀牙面：口述：棉球隔湿；蘸取酸蚀剂：酸蚀面积为牙尖斜面 2/3；恒牙酸蚀时间为 30s，乳牙为 60s；
- 2、冲洗、干燥牙面：水枪冲洗 10~15s，若用含磷酸的凝胶酸蚀剂，冲洗时间应加倍；口述：冲洗后应立即更换干棉卷隔湿；无油无水的压缩空气吹干牙面；干燥后酸蚀牙面应呈白色雾状外观；
- 3、涂布封闭剂：涂布方法：注意使封闭剂渗入窝沟，使窝沟内的空气排出；涂布面积：封闭材料覆盖全部酸蚀面；

五、口腔局部麻醉

（一）上牙槽神经阻滞麻醉

- 1、进针点：上颌第二磨牙远中颊侧根部前庭沟
- 2、行针过程：向后、上、内方刺入，以进针方向向深部刺入；

（二）下牙槽神经阻滞麻醉

- 1、进针点：翼下颌皱襞中点外侧 3~4mm，颊脂垫尖处
- 2、行针过程：以进针方向向深部刺入；

六、G.V.Black II 类洞制备术

窝洞设计：邻面洞略呈梯形（ \hat{a} 方小， \hat{a} 阶大）；颊、舌壁略外敞； \hat{a} 面扩展成鸠尾形，包括点隙窝沟；窝洞大小合适，尽量保留牙尖嵴，剩余牙体组织具有足够抗力，无薄弱尖

七、急性根尖周脓肿切开引流术

- 1、切开部位：于龈颊沟膨隆最低处切开黏膜，切口方向应与前庭沟平行
- 2、置引流条：脓腔内留置橡皮引流条，引流条末端少许露在脓腔外

八、牙拔除术（下颌第一磨牙为例）

牙的拔除：拔牙之前应仔细与病历和患者核对牙位；大块牙石，消毒患牙牙龈，检查麻醉效果；分离牙龈：使用牙龈分离器，正确使用分离器的工作面，应有支点；安置牙钳：放置牙钳时，钳喙长轴应与所拔患牙长轴平行，钳喙应充分向根尖方伸展，夹紧患牙；牙脱位：应先向颊侧、再向腭侧小幅度摇动，逐渐加大幅度，沿阻力小的方向，向下、远中及颊侧牵引拔出，拔除时应注意牙龈和对颌牙组织的保护。

九、口内缝合术

- 1、进针出针：用镊子夹住一侧皮片的中份拉起；在距离切口 2~3cm 处垂直进针；旋转进针；再行另一侧皮片拉起进针，旋转进针。

地址：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座

电话：010-88820136 传真：010-88820119 网址：www.wendu.com

2、拉线打结：用左手持针，缓慢拉线后，用持针器打结；再手握持针器，用左手食指推进结头，控制好缝线的松紧度，再用持针器反向打结后在打第三个结。

3、追加缝合：在切口中央缝合后，两侧各追加缝合，进针、出针、打结同上；缝合时针距和边距对称、均匀

十、磨牙邻牙合面合金嵌体的牙体预备

窝洞形态各壁位置和深度：①邻面部分：呈梯形（ $\frac{1}{3}$ 方小， $\frac{2}{3}$ 方大），钻磨到牙颈线以上 1mm 处，龈阶厚 1.0~1.5mm；② $\frac{1}{3}$ 面部分：鸠尾峡的宽度为邻面边缘嵴的 $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{3}$ ，位于轴髓角的内侧，轴髓线角应圆钝，鸠尾宽于鸠尾峡，小于边缘嵴处洞宽，洞深位于釉牙本质界下 0.5~1.0mm；③深度：牙本质浅层（釉牙本质界下 0.5~1.0mm）

十一、病史采集（口腔黏膜溃疡）

女，33岁，舌侧边缘溃疡5天。
考试时间：5分钟 总分：5分
1. 病史采集要点 (1)有无溃疡反复发作史 (2)有无局部创伤史 (3)有无皮肤病史 (4)有无外生殖器溃疡史 (5)有无眼部病史
2. 可能的诊断 (1)复发性口腔溃疡 (2)创伤性溃疡 (3)白塞病

十二、病例分析（龋病）

病例摘要 患者，女，32岁。 主 诉：右上前牙黑点1个月。 现病史：1个月前刷牙时发现上前牙两牙间有黑点，但无任何不适。 口腔检查：视诊见 2 近中面有褐色斑点，探针探查粗糙无龋洞。 X线片：牙面表浅处有透射影像。
考试时间：12分钟 总分：18分
诊断：2 邻面浅龋。
诊断依据： (1) 女，32岁，右上前牙有黑点1个月，无不适。 (2) 视诊见 2 近中面有褐色斑，探针探查粗糙无龋洞。 (3) X线片：2 牙面表浅处有透射影像。
鉴别诊断： (1) 牙釉质发育不全：常对称发生，探查时质地硬而光滑。 (2) 氟斑牙：白垩色，对称分布，质地较硬，可累及整个牙冠，有氟地生活史 (3) 中龋：冷热酸甜刺激入洞疼痛。
治疗原则：去净龋坏组织、保护牙体、保护牙髓。 (1) 药物疗法。 (2) 再矿化疗法。 (3) 充填治疗。

